

## 2. Impfkalender aller allgemein empfohlener Impfungen

### Säuglinge und Kleinkinder

Alter→ ↓Impfung	1. Lebensjahr						2. Lebensjahr					5. Jahr	6. Jahr
	7. Wo	3. Mo.	5. Mo.	6. Mo.	7. Mo.	11. Mo.	12. Mo.	13. Mo.	14. Mo.	20.-24. Mo.			
<b>Rotavirus (RV)</b>	RV 2 bzw. 3, Abstand mind. 4 Wo. in Abhängigkeit vom verwendeten Impfstoff												
<b>Diphtherie (DIP) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV) Haemophilus infl. B (HIB) Hepatitis B (HBV)</b>		1. 6-fach	2. 6-fach					3. 6-fach frühestens 6 Mo. nach 2. Teilimpfung					
<b>Pneumokokken (PNC)</b>		1. PNC	2. PNC					3. PNC frühestens 6 Mo. nach 2. Teilimpfung					
<b>Mumps Masern (MMR) Röteln</b>						MMR 2 Impfungen Abstand mind. 4 Wo.							
<b>Meningokokken<sup>1,2</sup></b>						1 x MEC-C							
<b>FSME</b>							1. FSME	2. FSME	3. FSME		FSME		
<b>Varizellen (VZV)</b>						VZV 2 Impfungen Abstand mind. 4, vorzugsweise 6 Wo.							
<b>Hepatitis A (HAV)</b>									1.HAV	2.HAV			
<b>Influenza (IV)<sup>3</sup></b>					IV jährlich								

Impfkalender aller empfohlenen Impfungen für Säuglinge und Kleinkinder

Kostenfrei
  Nicht kostenfrei
  Indikationsimpfung (nicht kostenfrei)

<sup>1</sup> MEC-C: konjugierter MenC Impfstoff bei Erstimpfung ab dem 12. Monat nur eine Dosis (kann im 3. Monat erstmals geimpft werden, dann 2. im Abstand von min. 8 Wochen).

<sup>2</sup> MenB: –Individualimpfung ab dem vollendeten 2. Lebensmonat; Indikationsimpfung für Risikopersonen siehe Kapitel Meningokokken

<sup>3</sup> IV: bei Kindern werden bei Erstimmunisierung (bis zum 8. Lebensjahr) 2 Impfungen mit min. 4 Wochen Abstand empfohlen.

## Schulkinder

Alter→ ↓Impfung	7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	10. Jahr	11. Jahr	12. Jahr	13. Jahr	14. Jahr	15. Jahr
<b>Diphtherie (dip)</b> <b>Tetanus (TET)</b> <b>Pertussis (PEA)</b> <b>Poliomyelitis (IPV)</b>	4-fach	nachholen					4-fach <sup>1</sup>		
<b>Hepatitis B (HBV)</b>		Grundimmunisierung (0/1/6 Monate) oder Auffrischung							
<b>Mumps</b> <b>Masern (MMR)</b> <b>Röteln</b>	(MMR Nachholen bei Ungeimpften oder nur 1x-Geimpften)								
<b>Humane Papillomviren (HPV)<sup>2</sup></b>				2 x HPV (0/6 Monate)			2 x HPV <sup>3</sup> (0/6 Monate)		
<b>Varizellen (VZV)</b>			2 x VZV (wenn nicht bereits 2x geimpft oder Erkrankung durchgemacht)						
<b>FSME</b>				FSME					
<b>Meningokokken<sup>4</sup></b> (MEC4)						MEC4			
<b>Influenza (IV)</b>	IV jährlich								

Impfkalender aller empfohlenen Impfungen für Schulkinder

<sup>1</sup> Für Kinder, die vorher nur eine dip+Tet+IPV Impfung erhalten haben

<sup>2</sup> Die HPV Impfung im 1+1 Schema, soll so früh wie möglich, ab dem vollendeten 9. Lebensjahr (= 9. Geburtstag) begonnen werden

<sup>3</sup> Catch-up Programm, ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zu einem günstigen Selbstkostenpreis

<sup>4</sup> Nachholschema für MenB Individualimpfung und Indikationsimpfung für Risikopersonen siehe Kapitel Meningokokken

Kostenfrei       Nicht kostenfrei

## Erwachsene

Erwachsene mit vorliegender Grundimmunisierung gemäß den Empfehlungen \*

Alter→ ↓Impfung	18.-20. Jahr	30. Jahr	40. Jahr	50. Jahr	60. Jahr	65. Jahr	70. Jahr	75. Jahr	80. Jahr usw.
<b>Diphtherie (dip)</b> <b>Tetanus (TET)</b> <b>Pertussis (PEA)</b> <b>Poliomyelitis (IPV)</b>	alle 10 Jahre auffrischen					alle 5 Jahre auffrischen			
<b>Humane Papillomviren (HPV)</b>	gegebenenfalls nachholen								
<b>Mumps</b> <b>Masern (MMR)</b> <b>Röteln</b>	gegebenenfalls nachholen								
<b>FSME</b>	alle 5 Jahre auffrischen					alle 3 Jahre auffrischen			
<b>Pneumokokken</b>	siehe Abschnitt Pneumokokken								
<b>Herpes Zoster (HZV)</b>	einmalige Gabe								
<b>Influenza (IV)</b>	IV jährlich								

Impfkalender aller empfohlenen Impfungen für Erwachsene

\* Nachholimpfplan (siehe Kapitel Impfabstände-Nachholimpfungen) für Personen konsultieren, bei denen die Grundimmunisierung ganz oder teilweise fehlt